〜安心安全な学校生活を目指して〜 第2号

令和 5 年6月7日 京都府立福知山高等学校·附属中学校

福高・福中で多いケガ BEST3は??

🍱 1位: すり傷

…昨年の中高トップのケガです。

2位: 捻挫

…何もないところで足を捻った…という人もいたり。

3位: 打撲

···予期せぬものが当たって打撲···なんてことも。



\ 知っておこう!

応急手当十

捻挫したとき、すり傷や鼻血がでたときどうすれば良いか分からない… そんな人のために!!

今回は基本から、鼻血がでたときや捻挫の対応について紹介します。 体育や部活動のときに、実践してみてください。



まず・・・・

スポーツを安全に 楽しむために

- 1体調管理
- ②進備運動
- ③整理運動
- 3点セットを意識して







手当てのおボン





傷口についた砂や汚れを 洗い流す





ビニール袋に入れた 氷などで冷やす



清潔なハンカチなどで 傷口をおさえる



鼻血がでた!

ほとんどの鼻血は、キーゼルバッハ部位(鼻の穴から 1cm ほど奥の場所)からの出血です。 まずは慌てずに、安静にしてからティッシュなどを詰めて右のイラストのとおり、小鼻を強く圧迫しましょう。

鼻血の止め方

- いすなどに座って安静にします。
- @ 顔は少し下向きに。
- 📵 小鼻を親指と人さし指でつまみ、強く押します。



10~15分で 止まります。

これはまちがい!

- ★ 血が垂れないように上を向く … 血がのどに流れてしまい、飲みこむと気分が悪くなります
- ※ 首の後ろをトントンたたく …… まったく意味がありません
- ★ ティッシュペーパーをつめる … 紙が粘膜にこびりついて、はがすときに再び出血します



受診したほうが よいときは

- 30分以上圧迫しても止まらないとき
- 顔色が悪い、ふらつく、冷や汗がでる、呼吸や脈が速いとき
- 顔や鼻、頭をぶつけて鼻血がでたときは、骨折を疑い受診します



すぐに、しっかり応急手当をすることが早く治すポイントです。

応急手当の基本は、「 RICE 」です。

※痛みや腫れがひどいときは、病院を受診しましょう。



Rest(安静)

安静にします。ムリに動かしたり、 もんだり、ひっぱったりしてはいけ ません。むやみに動かすと、より悪 化することがあります。



Ice(冷却)

氷を入れたビニール袋をタオルなどで 包み、痛いところにあてることで痛み や腫れを抑えられます。

15 分ほど冷やして感覚がなくなった ら外し、また痛みが出たら冷やします。 これを1日くり返します。



Compression(圧迫)

テープや包帯で軽く圧迫するように 巻きます。腫れや内出血を最小限に 抑えます。

プッシュ



Elevation(学上)

痛いところを心臓よりできるだけ高くあげます。血液が心臓に向かって流れるので、内出血による腫れを防ぐことができます。座布団やクッション、たたんだ毛布などを敷くとよいでしょう。



学校にいるときや、出かけているときなどに知っている人・知らない人が倒れている時に遭遇する可能性もあります。そんなときどうすればいいか、知っておくだけでも、その人を助けることができます。

胸骨圧迫

普段通りの呼吸をしていなかったら、胸を プロジュ





やるべきことは?

- ●大きな声で応援を呼ぶ
- 周りの人に119番通報をお願いする
- 近くにAEDがあれば持ってきてもらう



学校:第一体育館入り口・岳南グラウンド



AEDってなにをするもの?

心臓がけいれんして血液を全身に 送れなくなったときに使用する機械 です。電気ショックによって心臓を 正常な状態に戻します。



どうやって使うの?

AÉD

が

到着し

電源を入れると操作説明のメッセージが流れるので、その通 リに。電気ショックの必要があ るかどうかも機械が判断してく れます。



電気ショック後 または 電気ショックが不要だった場合

すぐに胸骨圧迫を再開します。 AEDは2分ごとにショックが必要か自動的に判断するので、救 急隊が到着するまでAEDと胸骨 圧迫をくりかえしましょう。

